

Uniones difíciles: corteza incluida, chupones, codominantes y guías

Curso de Arboricultura · Tema 6: Codominantes, guías, formación y desmoche · Clase 1

En 3 ideas

1. Cuando una rama y el tronco crecen muy próximos y con un ángulo cerrado, sus cortezas quedan apretadas y atrapadas en el interior de la unión.
2. Primero se elimina el peso dejando un tocón.
3. Los brotes que nacen de yemas latentes crecen deprisa y muy pegados al tronco, no forman arruga de corteza y durante sus primeros años están débilmente sujetos.

Puntos clave de la clase

1. **La corteza incluida.** En lugar de la arruga de corteza levantada se observa una línea hundida hacia dentro.
2. **Cómo retirar una rama con corteza incluida.** Después se localiza el extremo inferior de la corteza incluida, se proyecta hacia el exterior y desde ese punto se realiza el corte final de abajo hacia arriba, sin dañar el tronco en la horquilla.
3. **Los brotes epicórmicos.** Un chupón grande no debe considerarse una rama fiable.
4. **Troncos codominantes: fuertes y débiles.** La resistencia de una unión entre troncos codominantes depende del tipo de unión, no del ángulo.
5. **Eliminar un tronco codominante.** Los troncos carecen de zona de protección, por lo que siempre quedará un defecto, pequeño si el corte es correcto, que el árbol aislará con su zona de barrera.
6. **Eliminar una guía en un árbol joven.** Se baja la parte superior en dos cortes y el corte final se realiza justo por encima de una rama lateral siguiendo su arruga de corteza.

Errores típicos

- Nunca debe pasarse una cuerda de trepa alrededor de una unión débil.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/arboricultura/tema/6/clase/1>

© Academia de Jardinería