

Callo, madera de herida, estaciones y chancros

Curso de Arboricultura · Tema 7: Heridas, cavidades y grietas · Clase 1

En 3 ideas

1. Tras una herida, las células vivas de la zona cambial del borde comienzan a dividirse.
2. Cuando la madera de herida crece muy deprisa, puede enrollarse hacia el interior.
3. Las heridas producidas en primavera, durante el despliegue de las hojas, suelen mostrar una muerte moderada de corteza alrededor, columnas de infección pequeñas y rodetes grandes.

Puntos clave de la clase

1. **Del callo a la madera de herida.** Al disminuir la presión, las primeras células son redondeadas e indiferenciadas: forman el callo.
2. **Los cuernos de carnero.** Al encontrarse los dos bordes enrollados, sus cortezas no se sueldan y la herida no se cierra por completo.
3. **Las heridas y las estaciones.** Las producidas a mitad de la temporada de crecimiento muestran muy poca muerte de corteza y rodetes moderados.
4. **Qué es un chancro.** Toda zona muerta de corteza es una lesión.
5. **Cómo tratar los chancros.** Los chancros pequeños pueden eliminarse retirando la corteza muerta y una pequeña franja de corteza sana alrededor, con cortes superficiales, preferentemente justo después de la formación completa de las hojas.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/arboricultura/tema/7/clase/1>

© Academia de Jardinería