

Esquejes

Curso de césped · Tema 4: Establecimiento de céspedes · Clase 9

En 3 ideas

1. Los esquejes, a diferencia de tepes y tapones, no llevan tierra adherida.
2. Se usan sobre todo en especies capaces de emitir estolones —Cynodon, Stenotaphrum y similares—.
3. El estolón es a la vez parte de la planta y estructura reproductiva.

Puntos clave de la clase

1. El método es más caro y trabajoso que sembrar, pero mantiene intactas las características genéticas del material.
2. En campos de golf o fútbol, las plantadoras de bermudas híbridas abren surco, distribuyen, introducen y cierran con rulo en una pasada, alterando poco la superficie.
3. De un metro cuadrado de tepe se obtienen, según especie, desde unos 550–1100 esquejes (Stenotaphrum, Eremochloa) hasta 2200–4400 (Cynodon, Zoysia), con densidades de esquejes por metro muy altas en el material denso.
4. Con un metro cuadrado de césped bien desarrollado podéis establecer, aproximadamente, unos 20 m².
5. Son escalas para dimensionar pedido y logística, no para sustituir el criterio del vivero local.
6. La obtención frecuente en vivero o en zonas de bermuda pasa por escarificar, sacar planta a la superficie y recoger con barredora o rastrillo para plantar enseguida.

Herramientas y materiales

- ☐ Rastrillo
- ☐ Barredora
- ☐ Arena
- ☐ Tepes
- ☐ Esquejes
- ☐ Metro



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/4/clase/9>

© Academia de Jardinería