

# Cercospora y Gaeumannomyces

Curso de césped · Tema 9: Plagas y enfermedades del césped · Clase 13

## En 3 ideas

---

1. El patógeno es *Cercospora fusimaculans*, y afecta a los céspedes formados por *Stenotaphrum secundatum*.
2. Se observa entre el final de la primavera y el verano, sobre todo en periodos húmedos o de lluvias frecuentes, y los céspedes estresados son más susceptibles.
3. En las hojas aparecen pequeñas manchas alargadas e irregulares, con el centro marrón oscuro y un anillo oscuro que las bordea, y toda la mancha puede acabar de ese color.

## Puntos clave de la clase

---

1. Para prevenirla se recomienda fertilizar adecuadamente, usando fertilizantes nitrogenados de liberación lenta y aportando también potasio poco a poco.
2. La otra enfermedad la causa el hongo *Gaeumannomyces graminis*, en su variedad *graminis*.
3. Las especies susceptibles son sobre todo algunos cultivares de *Agrostis*, aunque también la bermuda y el *Stenotaphrum*.
4. Forma manchas circulares de color pardo o amarillento bronce, que pueden medir hasta varios metros de diámetro y aparecen al final de la primavera.
5. Una pista útil para el diagnóstico está bajo tierra: las plantas infectadas tienen las raíces de color pardo oscuro.
6. Esta enfermedad es más grave en suelos poco fértiles y arenosos, y se presenta sobre todo con humedad alta y con un pH de 6,5 o más.



**[cursosdejardineria.com](https://cursosdejardineria.com)**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/9/clase/13>

© Academia de Jardinería