

Típula

Curso de césped · Tema 9: Plagas y enfermedades del césped · Clase 22

En 3 ideas

1. Son varias las especies que se encuentran en los céspedes, y las más importantes son *Tipula paludosa* y *Tipula oleracea*.
2. Las larvas se alimentan de raíces y pasan la mayor parte de su vida enterradas, aunque por la noche salen para comer la parte aérea de la planta.
3. Pueden ser un problema en cualquier césped, porque cada hembra pone hasta 200 o 300 huevos en la superficie del suelo, que eclosionan en 10 a 15 días.

Puntos clave de la clase

1. Un dato que llama la atención es que la especie de césped influye mucho en el ataque.
2. La humedad del terreno y el clima influyen en que el insecto se instale, y le favorecen los inviernos suaves y los veranos frescos y húmedos.
3. Dentro del césped, las larvas se encuentran sobre todo en las zonas con fieltro y con mal drenaje.
4. Los adultos parecen mosquitos zancudos de gran tamaño, voladores y frágiles, con las patas muy largas y finas y el cuerpo delgado, de color marrón grisáceo.
5. Una vez adultos no se alimentan del césped ni pican; el problema son sus larvas, que atacan a las raíces.
6. A los adultos de *Tipula paludosa* se les distingue por una banda estrecha y oscura a lo largo del borde delantero del ala, junto a una banda clara.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/cesped/tema/9/clase/22>

© Academia de Jardinería