

Procesionaria del pino

Curso de endoterapia · Tema 3: Plagas y enfermedades tratadas con endoterapia · Clase 2

En 3 ideas

1. Viene del peligro urticante para personas y animales en zonas de uso humano.
2. Agrupan los huevos en torno a un par de acículas y los cubren con escamas de color marrón brillante.
3. Las larvas emergen unos treinta a cuarenta días después y empiezan a comer acículas.

Puntos clave de la clase

1. Mientras se alimentan tejen bolsones de seda para protegerse del frío.
2. Esa actividad de tejido se intensifica a partir del tercer estadio larvario, unos treinta días después de avivar, cuando ya desarrollan pelos urticantes.
3. Desde los bolsones salen a comer en días soleados y cálidos, aunque su capacidad de ingesta disminuye según el momento.
4. El bolsón no es solo un síntoma visual: es el refugio que explica por qué a veces la gente solo se asusta cuando ve la procesión, aunque el daño y el riesgo ya venían de antes.
5. Al final del invierno las larvas completan el ciclo larvario y bajan en procesión a tierra para enterrarse y crisalidar.
6. Las polillas emergerán el verano siguiente, pero pueden quedarse en diapausa varios años más.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Los tratamientos por esta vía suelen realizarse entre septiembre y diciembre, habitualmente con abamectina según registro y criterio técnico.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/endoterapia/tema/3/clase/2>

© Academia de Jardinería