

Compartimentalización en palmeras

Curso de endoterapia · Tema 7: Heridas en endoterapia · Clase 4

En 3 ideas

1. Si aplicas CODIT a un fénix o a una canaria como si fuera un plátano, te equivocas de planta.
2. Shigo lo dijo con claridad en mil novecientos noventa y tres: cuando una palmera se daña, hay cambios químicos en las células de alrededor que impiden el desarrollo de infecciones.
3. Reacciona, pero no crea las barreras físicas del árbol.

Puntos clave de la clase

1. Hay una reacción química que intenta dejar la zona dañada fuera de circulación.
2. Weiner y Liese, en mil novecientos noventa y cinco, taladraron el estípite de una Roystonea regia adulta.
3. Agujeros de cuatro milímetros de diámetro y cuarenta de profundidad, a tres alturas y en cuatro fechas distintas, y luego tala y disección.
4. A las veinticuatro horas, a los siete días, a los catorce y a los veintiuno se veía el daño crecer y, a la vez, la reacción.
5. En el microscopio apareció tilosis, secreciones y acumulación de compuestos fenólicos en vasos, parénquima y fibras.
6. Usa los puentes intervasculares para sortear la zona dañada por las heridas de endoterapia.

Errores típicos

- No puede cerrar la herida.
- No va a taparse con un anillo nuevo que recubra el daño.
- No vas a tener una cuarta barrera que tape el agujero por fuera en dos o tres años.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/endoterapia/tema/7/clase/4>

© Academia de Jardinería