

Melocotonero: poda de fructificación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 8

En 3 ideas

1. El melocotonero da la flor y la fruta sobre las ramas que crecieron el año anterior.
2. Una rama que ya ha dado fruto no vuelve a florecer en el mismo tramo, salvo que en ella aparezca un ramillete de mayo o una rama chifona.
3. Las ramas fructíferas pueden alargarse gracias a su yema terminal y dar fruta en el brote nuevo, pero entonces la madera vieja queda sin elementos fértiles y la fruta se aleja cada año más de la rama principal.

Puntos clave de la clase

1. **Reconocer los órganos en invierno.** La rama de madera solo lleva yemas puntiagudas de madera, que darán hojas y brotes.
2. **Árboles de pleno viento.** La poda de fructificación del pleno viento es, sobre todo, una poda de aclareo de la copa y de renovación de las ramas que ya han fructificado.
3. **Cuándo podar.** Tradicionalmente se podaba desde noviembre hasta finales de febrero, antes de que subiera la savia y nunca con la madera helada.
4. **Casos en las formas en empalizado.** En el empalizado la poda busca dos cosas a la vez: asegurar la fruta del año y obtener reemplazos lo más cerca posible de la rama principal, manteniendo los pitones en el espacio que les corresponde.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Tradicionalmente se podaba desde noviembre hasta finales de febrero, antes de que subiera la savia y nunca con la madera helada. En España, como en todos los frutales de hueso, las heridas sueltan goma y pueden dar entrada a chancros, por lo que se poda poco, con tiempo seco y preferentemente al final del invierno, evitando la lluvia y las heladas.

Herramientas y materiales

- ☐ Serrucho
- ☐ Pasta cicatrizante

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/8>

© Academia de Jardinería