

Tema 4: Albaricoquero y melocotonero

Curso de poda de árboles frutales

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Albaricoquero: ficha, órganos y yemas	2
Clase 2	Albaricoquero: obtener el vástago y formar el pleno viento	3
Clase 3	Albaricoquero: palmeta irregular y poda de fructificación	4
Clase 4	Albaricoquero: verano, aclareo y restauración	5
Clase 5	Melocotonero: ficha, órganos y yemas	6
Clase 6	Melocotonero: vástago y formas de pleno viento I	7
Clase 7	Melocotonero: pleno viento II y formas en empalizado (U sencilla, U doble, palmeta irregular)	8
Clase 8	Melocotonero: poda de fructificación	9
Clase 9	Melocotonero: verano, aclareo y restauración	10

**cursosdejardineria.com**<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4>

© Academia de Jardinería

Albaricoquero: ficha, órganos y yemas

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 1

En 3 ideas

1. Árbol pequeño de hoja caduca, de 6 a 8 m.
2. Formación (esqueleto y ramas fructíferas), fructificación (mantener la fruta y la forma) y restauración (árboles viejos o descuidados).
3. Pitón: pequeña rama sobre las prolongaciones; lleva la fruta.

Puntos clave de la clase

1. **El árbol.** Copa redondeada que pronto se extiende; corteza marrón oscura, lisa y luego agrietada a lo largo.
2. **Tipos de poda y ficha.** Pleno viento: tallo y medio tallo, formación de 4 a 5 años; vaso de tallo bajo, de 3 a 4 años; aclareo cada 3 años; restauración tras unos 20 años (difícil).
3. **Órganos.** Chupón: rama muy fuerte (hasta 2 m al año), con ramas anticipadas; solo sirve como prolongación o para sustituir una rama principal desnuda.
4. **Yemas al brotar.** Las de madera se alargan y verdean; los botones florales se hinchan y muestran pétalos rosados (una flor cada uno).
5. **Antes de formar.** Árbol formado en vivero o a partir de un vástago; en ambos casos se sigue su formación.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Cosecha de principios de junio a principios de agosto. Calendario: por la goma y los chancros, en España se prefiere podar con tiempo seco, tras la cosecha o al final del invierno, evitando épocas lluviosas.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/1>

© Academia de Jardinería

Albaricoquero: obtener el vástago y formar el pleno viento

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 2

En 3 ideas

1. Arbolito joven injertado sobre un pie con la variedad elegida.
2. Tallo bajo en vaso libre: 40 a 60 cm.
3. Año 1: corte sobre 3 yemas de madera a la altura elegida y desyemado de las sobrantes.

Puntos clave de la clase

1. **Vástago vigoroso.** Algunas anticipadas se dejan como tirasavia, cortadas sobre sus yemas estipulares con un solo brote, y se pinzan a 2 o 3 hojas en verano.
2. **Vástago débil: rehacer la guía.** Año 1: yema elegida opuesta al injerto, a unos tres cuartos de altura; corte 3 yemas por encima (tocón para atar) y desyemado de esas tres.
3. **Formar la copa.** Año 2 (o 3): las 3 ramas, sobre una yema exterior a 25-30 cm; las 2 últimas yemas deben brotar (6 ramas).

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/2>

© Academia de Jardinería

Albaricoquero: palmeta irregular y poda de fructificación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 3

En 3 ideas

1. Ramas principales repartidas sin simetría, a unos 50 cm entre sí; árboles a 4 o 5 m.
2. Aclareo y rejuvenecimiento cada 3 o 4 años: despunte de las principales, ramificaciones suprimidas, fuera las ramas hacia dentro y las que desequilibran.
3. Objetivo: fruta del año y reemplazos cerca de la rama principal.

Puntos clave de la clase

1. **La palmeta irregular.** Contra un muro al sureste o al suroeste, con tejadillo, en zonas frías; malla o tela contra las heladas en flor.
2. **Fructificación en pleno viento.** Podar de más da madera, chupones, chancros y muerte de ramas.
3. **Fructificación en palmeta.** Se poda en febrero, en botón rosa.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Mejor en octubre o noviembre, con tiempo seco y nunca con la madera helada. Se poda en febrero, en botón rosa.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/3>

© Academia de Jardinería

Albaricoquero: verano, aclareo y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 4

En 3 ideas

1. Desbrotado, desde finales de abril o principios de mayo: en cada pitón se dejan 1 o 2 brotes de reemplazo en la base, los que acompañan a los frutos y el tirasavia de la punta.
2. Si el pitón quedó sin fruta por caída, helada o plaga, puede hacerse desde la primavera.
3. El albaricoquero viejo pierde vigor y da fruta pequeña y escasa, pero rebrota bien de madera vieja si está sano y con vigor.

Puntos clave de la clase

1. **Trabajos de verano en empalizado.** Pinzamientos: brotes que acompañan a los frutos a 3 o 4 hojas; tirasavia de la punta a 4 a 6 hojas.
 2. **Poda de verano o de cosecha.** En España es época seca: las heridas cierran mejor, algo importante por la goma.
 3. **Restauración.** Con muchos chancros o ramas secas, mejor consultar a un técnico.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/4>

© Academia de Jardinería

Melocotonero: ficha, órganos y yemas

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 5

En 3 ideas

1. Ramas rectas de joven que se inclinan con la edad.
2. Medio tallo: formación de 4 a 5 años.
3. Pitón: rama pequeña sobre las prolongaciones; lleva la fruta.

Puntos clave de la clase

1. **El árbol.** Fruta temprana pero vida corta: rara vez llega a 20 años.
2. **Ficha.** Vaso de tallo bajo: de 2 a 4.
3. **Órganos.** Chupón: hasta 2 m al año, con anticipadas; solo como prolongación o para sustituir una principal desnuda.
4. **Yemas al brotar.** Las de madera verdean y se alargan; los botones muestran pétalos rosados y dan una flor cada uno.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Cosecha de junio a octubre según variedad. Zonas frías: espaldera, poda algo más intensa y trabajos de verano.

Errores típicos

- Nunca se corta una anticipada sobre sus yemas estipulares: no rebrota y se pierde el pitón.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/5>

© Academia de Jardinería

Melocotonero: vástago y formas de pleno viento I

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 6

En 3 ideas

1. Árbol formado en vivero o a partir de un vástago; en ambos casos se sigue su formación tras plantar.
2. Medio tallo: tronco de 1 a 1,20 m.
3. Desyemado: se quita una yema para que no salga un pitón donde no interesa.

Puntos clave de la clase

1. Empalizado compensador: se baja provisionalmente la rama superior más fuerte y se sube la inferior más débil; con el equilibrio recuperado, cada rama se ata en su sitio.
2. Poda de formación en reposo tras plantar; en España, con tiempo seco al final del invierno.
3. Especie vigorosa: la copa se forma desde el año de plantación; en variedades débiles se rehace la guía y se empieza el segundo año.
4. Año 1: corte sobre 3 yemas de madera por encima de la altura elegida; desyemado de las sobrantes; algunas anticipadas del tronco como tirasavia, cortadas sobre estipulares con un brote y pinzadas a 2 o 3 hojas.
5. Año 1: yema opuesta al injerto a tres cuartos de altura; corte 3 yemas por encima (tocón) y desyemado; anticipadas sobre estipulares; tirasavia y anticipadas pinzadas a 2 o 3 hojas; guía atada al tocón.
6. Año 2: fuera el tocón y las tirasavia bajas; anticipadas de la guía sobre estipulares con un brote pinzado a 3 o 4 hojas; corte sobre 3 yemas a la altura deseada para las 3 primeras ramas principales.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Poda de formación en reposo tras plantar; en España, con tiempo seco al final del invierno.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/6>

© Academia de Jardinería

Melocotonero: pleno viento II y formas en empalizado (U sencilla, U doble, palmeta irregular)

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 7

En 3 ideas

1. Ahora toca multiplicarlas.
2. Las formas en empalizado nacieron para cultivar el melocotonero en zonas frías, delante de un muro orientado al sureste o al suroeste.
3. Es la forma más sencilla y la más equilibrada: dos ramas principales verticales separadas 50 cm, unidas abajo por un codo en forma de U.

Puntos clave de la clase

1. **Terminar la copa de pleno viento.** El segundo año, o el tercero si hubo que rehacer la guía, esas tres ramas se cortan a unos 25 o 30 cm de largo, siempre por encima de una yema que mire hacia el exterior de la copa.
2. **Por qué poner un melocotonero contra un muro.** La pared acumula calor de día y lo devuelve de noche, y una tela tendida por la noche protege la floración de las heladas de primavera.
3. **La U sencilla.** Como las dos ramas están a la misma altura, el vigor se reparte a partes iguales.
4. **La U doble.** También muy equilibrada, tiene un tronco corto de 25 a 30 cm coronado por dos ramas que se dividen a su vez en dos, de modo que suben cuatro ramas verticales separadas 50 cm.
5. **La palmeta irregular.** En esta forma las ramas principales se reparten por el muro a unos 50 cm unas de otras, sin buscar simetría, y la superficie que se cubre depende de la altura de la pared y del vigor de la variedad.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En verano se atan los brotes que han salido de las prolongaciones del año anterior: serán los pitones, las ramas cortas que llevan la fruta, y conviene que queden regulares a ambos lados, como una espina de pescado.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/7>

© Academia de Jardinería

© Academia de Jardinería

Melocotonero: verano, aclareo y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 4: Albaricoquero y melocotonero · Clase 9

En 3 ideas

1. En las formas en empalizado la poda de fructificación del invierno tiene que ir seguida, durante el periodo vegetativo, por una serie de operaciones complementarias.
2. Algunos años las palmetas y los árboles de pleno viento cuajan demasiada fruta.
3. Las ramas que han fructificado se suprimen en cuanto se termina la recolección, o incluso antes si los frutos han caído prematuramente.

Puntos clave de la clase

1. **Los trabajos de verano en el empalizado.** Sin ellas, los pitones se llenan de brotes que se dan sombra unos a otros y el reemplazo no se forma bien.
2. **El aclareo de frutos.** Si se deja toda, los melocotones quedan pequeños, el árbol se agota y la cosecha del año siguiente se resiente.
3. **La poda después de la recolección.** Se corta por encima del brote de reemplazo, que así recibe toda la fuerza del final del verano y se refuerza para fructificar al año siguiente.
4. **Por qué hay que restaurar el melocotonero.** El melocotonero envejece muy rápido.
5. **Restaurar un árbol de pleno viento.** En árboles envejecidos o poco cuidados, pero plantados en una zona adecuada y en un buen terreno no calizo, a menudo aparecen brotes vigorosos en la base de las ramas principales.
6. **Restaurar una palmeta.** Los melocotoneros en palmeta envejecen aún más deprisa que los de pleno viento y es frecuente que desaparezcan los pitones en tramos de las ramas principales.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En las formas en empalizado la poda de fructificación del invierno tiene que ir seguida, durante el periodo vegetativo, por una serie de operaciones complementarias. Si un pitón ya no lleva frutos por una caída fisiológica fuerte, una helada, un granizo o una plaga, esta poda puede adelantarse a la primavera.

Herramientas y materiales

- ☐ Tijeras
- ☐ Pasta cicatrizante

Errores típicos

- No se transmite con la poda ni se cura podando: la propagan los pulgones y las plantas infectadas.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/4/clase/9>

© Academia de Jardinería