

Cítricos: mata arbustiva, fructificación y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 6: Cítricos, higuera, olivo y vid · Clase 2

En 3 ideas

1. La mata tiene varias ramas que salen casi desde el nivel del suelo, sin tronco visible.
2. En vivero se ven a menudo mandarinos formados en tallo bajo con un tronco muy corto, de unos 20 cm, y unas ramas principales delgadas y esbeltas que solo se ramifican de forma irregular en el extremo.
3. Realizada con regularidad, esta poda se limita a una simple limpieza.

Puntos clave de la clase

1. **Formación en mata.** Es una forma compacta, muy adecuada para cultivar cítricos en cajas de madera o en macetones que se resguardan en invierno.
2. **Un caso frecuente: el mandarino en tallo bajo.** Durante el invierno siguiente al primer año de vegetación se cortan aproximadamente por la mitad estas ramas principales, para obtener una ramificación más cercana al suelo.
3. **Poda de fructificación.** Cuando se abandona, los cítricos tienden a formar numerosas ramas principales que se estorban.
4. **Poda de restauración.** Si no se ha estado lo bastante atento, se pueden rebajar intensamente las ramas principales para obtener un ramaje nuevo, aprovechando que los cítricos emiten brotes con facilidad desde la madera vieja.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Es una forma compacta, muy adecuada para cultivar cítricos en cajas de madera o en macetones que se resguardan en invierno. En España esta poda se hace en general a finales del invierno o en primavera, una vez pasado el riesgo de heladas, porque los brotes que provoca son sensibles al frío.

Herramientas y materiales

- ☐ Pasta cicatrizante
- ☐ Nivel



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/6/clase/2>

© Academia de Jardinería