

Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero

Curso de poda de árboles frutales

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Avellano	2
Clase 2	Castaño	3
Clase 3	Nogal	4
Clase 4	Caqui	5
Clase 5	Membrillero	6
Clase 6	Níspero	7



cursosdejardineria.com

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7>

© Academia de Jardinería

Avellano

Curso de poda de árboles frutales · Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero · Clase 1

En 3 ideas

1. El avellano es un arbusto que forma matas frondosas, con ramas flexibles y hojas caducas, que puede alcanzar de 4 a 5 m de altura.
2. El avellano resiste muy bien el frío.
3. La poda de formación crea un arbusto bien ramificado con el número de ramas necesario para una buena mata.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Produce raíces fuertes y rastreras.
2. **Suelo y clima.** Poco exigente en cuanto al suelo, prefiere los terrenos ácidos y frescos y rechaza los suelos pesados y con agua estancada.
3. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene una producción anual regular renovando las ramas después de unos 5 años de producción y estimulando la emisión de ramas nuevas.
4. **Formar una mata.** El avellano se vende en vivero como una mata de tres o cuatro ramas de distintos tamaños.
5. **Poda de fructificación.** Después de unos 5 años de producción hay que renovar las ramas más viejas, en las que la fructificación disminuye mucho.
6. **Poda de restauración.** La mata rebrota desde la cepa.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda de fructificación se hace de noviembre a febrero. En España prospera en el norte y en zonas frescas del interior; en zonas cálidas y secas necesita riego en verano y algo de sombra en las horas de más calor.

Herramientas y materiales

- ☐ Serrucho
- ☐ Acolchado



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7/clase/1>

© Academia de Jardinería

Castaño

Curso de poda de árboles frutales · Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero · Clase 2

En 3 ideas

1. El castaño es un árbol de hojas caducas que puede alcanzar 20 m de altura, de porte erguido y madera muy dura.
2. El castaño no tolera los suelos calizos.
3. La poda de formación crea el esqueleto con un número de ramas principales necesario para una forma concreta y provoca la aparición de ramas fructíferas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** La floración tiene lugar en mayo o junio.
2. **Suelo.** Se adapta bien a los suelos silíceos o graníticos, bien drenados, con un pH de 5 a 6.
3. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene la producción conservando la forma elegida.
4. **Poda de formación en vaso de medio tallo.** El castaño casi nunca se vende formado: se compra en vivero como plantón o resalvo, o se injerta sobre un pie franco.
5. **Cuándo podar.** La poda del castaño se hace durante el reposo vegetativo, de noviembre a febrero.
6. **Poda de fructificación o escamonda.** Consiste en una poda más o menos intensa cada 5 a 10 años, en invierno.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La cosecha se reparte entre septiembre y noviembre, según las variedades. La poda del castaño se hace durante el reposo vegetativo, de noviembre a febrero.

Herramientas y materiales

- ☐ Serrucho
- ☐ Semillas
- ☐ Navaja



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7/clase/2>

© Academia de Jardinería

Nogal

Curso de poda de árboles frutales · Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero · Clase 3

En 3 ideas

1. El nogal es un árbol de hojas caducas muy vigoroso, que puede alcanzar de 20 a 30 m de altura.
2. El nogal resiste bien los fríos intensos del invierno, pero sus brotes son sensibles a las heladas primaverales; en zonas con heladas tardías conviene elegir variedades de brotación tardía.
3. La poda de formación crea el esqueleto con un número de ramas principales y provoca la aparición de ramas fructíferas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** El tronco tiene una corteza lisa y blanquecina.
2. **Suelo y clima.** Es poco exigente en cuanto al suelo y soporta incluso los calizos, aunque por sus raíces profundas prefiere suelos ricos, silíceo arcillosos, permeables y sin agua estancada.
3. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene la producción conservando la forma inicial.
4. **Poda de formación en tallo y medio tallo.** Se puede plantar un nogal formado en vivero o formarlo a partir de un plantón.
5. **Cuándo podar.** El nogal se poda a finales de verano o en otoño, de octubre a noviembre, cuando las heridas cicatrizan mejor.
6. **Poda de fructificación.** El nogal tiene una médula ancha y cicatriza mal, por lo que soporta muy mal la poda: los cortes favorecen la entrada de enfermedades e insectos.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. El nogal resiste bien los fríos intensos del invierno, pero sus brotes son sensibles a las heladas primaverales; en zonas con heladas tardías conviene elegir variedades de brotación tardía. El primer año, en otoño, tras plantar el plantón, se corta por encima de tres yemas elegidas a la altura deseada: 1,20 a 1,40 m en medio tallo y unos 2 m en tallo.

Errores típicos

- No se puede hablar de una poda de fructificación propiamente dicha.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7/clase/3>

© Academia de Jardinería

Caqui

Curso de poda de árboles frutales · Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero · Clase 4

En 3 ideas

1. El caqui es un árbol de hojas caducas que puede alcanzar 15 m de altura, de porte redondeado o piramidal.
2. El caqui es muy resistente al frío en reposo, por lo que se puede plantar en zonas frías, pero necesita temperaturas elevadas en verano y otoño para que los frutos maduren.
3. La poda de formación crea el esqueleto con un número de ramas principales y provoca la aparición de ramas fructíferas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Las flores femeninas, de color amarillento, aparecen en mayo o junio; las masculinas se reúnen en ramilletes en las axilas de las hojas.
2. **Suelo y clima.** Se planta en un suelo profundo, fértil y bien drenado, con pH de 6 a 6,5.
3. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene una producción regular en las ramas fructíferas conservando la forma elegida.
4. **Formación en tallo y medio tallo.** Se puede plantar un caqui formado en vivero o formarlo a partir de un plantón; en ambos casos hay que terminar las ramas principales y secundarias.
5. **Cuándo podar.** El caqui se poda en reposo vegetativo, entre noviembre y febrero.
6. **Palmeta irregular.** La palmeta se guía contra un muro en espaldera o sobre un armazón de alambres en contraespaldera.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. El caqui es muy resistente al frío en reposo, por lo que se puede plantar en zonas frías, pero necesita temperaturas elevadas en verano y otoño para que los frutos maduren. El primer año, entre noviembre y marzo, tras plantar el plantón se recortan las raíces pero no la guía.

Herramientas y materiales

- ☐ Rafia
- ☐ Semillas



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7/clase/4>

© Academia de Jardinería

Membrillero

Curso de poda de árboles frutales · Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero · Clase 5

En 3 ideas

1. El membrillero es un árbol de hojas caducas, de 4 a 5 m de altura, con la copa redondeada y el tronco tortuoso.
2. El membrillero prefiere suelos consistentes y frescos y lleva mal los suelos muy calizos, en los que puede presentar clorosis.
3. La poda de formación crea el esqueleto, obtiene una o más ramas principales y provoca la aparición de ramas fructíferas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Las flores, solitarias, blanco rosadas y perfumadas, se abren en mayo.
2. **Suelo y clima.** Se cultiva en casi toda España; en zonas secas agradece riego en verano durante el engorde del fruto.
3. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene la producción conservando la forma inicial.
4. **Poda de formación en medio tallo o tallo bajo.** Se puede plantar un membrillero formado en vivero o formarlo a partir de un plantón, un resalvo o un pie franco que se injerta.
5. **Cuándo podar.** La poda del membrillero se hace durante el reposo vegetativo, de noviembre a finales de febrero, con tiempo seco.
6. **Poda de fructificación.** El membrillero produce flores solitarias en el extremo de brotes cortos.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Se cultiva en casi toda España; en zonas secas agradece riego en verano durante el engorde del fruto. La poda del membrillero se hace durante el reposo vegetativo, de noviembre a finales de febrero, con tiempo seco.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7/clase/5>

© Academia de Jardinería

Níspero

Curso de poda de árboles frutales · Tema 7: Avellano, castaño, nogal, caqui, membrillero y níspero · Clase 6

En 3 ideas

1. El níspero europeo es un árbol de hojas caducas de 4 a 5 m de altura.
2. Se adapta a suelos pedregosos y poco profundos, aunque prefiere suelos ricos y bien drenados.
3. La poda de formación crea el esqueleto con un número de ramas principales y provoca la aparición de ramas fructíferas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** El tronco es corto, tortuoso y de corteza gris.
2. **Los tipos de poda.** La poda de fructificación mantiene la producción conservando la forma inicial.
3. **Poda de formación en medio tallo.** Se puede plantar un níspero formado en vivero o formarlo a partir de un plantón, un resalvo o un pie franco que se injerta.
4. **Poda de formación en mata.** Después de plantar un plantón o un resalvo, se corta a cuatro o cinco yemas desde el suelo.
5. **Cuándo podar.** El níspero se poda durante el reposo vegetativo, de finales de noviembre a febrero, con tiempo seco.
6. **Poda de fructificación.** La fructificación aparece sobre la madera del año anterior: cuanto más vigorosas son esas ramitas, más grandes y numerosos son los frutos.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. El níspero se poda durante el reposo vegetativo, de finales de noviembre a febrero, con tiempo seco.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/7/clase/6>

© Academia de Jardinería