

Arándanos

Curso de poda de árboles frutales · Tema 8: Arándano, frambueso y zarzamora · Clase 1

En 3 ideas

1. El arándano negro o mirtilo es un arbusto silvestre de 30 a 50 cm de altura, de hojas caducas.
2. El arándano negro prefiere la sombra, el americano una situación soleada y el rojo la semisombra.
3. La poda de formación crea una mata o un arbusto ramificado con el número de ramas necesario.

Puntos clave de la clase

1. **Las especies.** Sus flores, acampanadas y rosas, aparecen en la madera del año anterior.
2. **Exposición y suelo.** Todos requieren un suelo ligero, arenoso y rico en humus, con un pH de 3,5 a 5.
3. **Los tipos de poda.** La poda de restauración rejuvenece las matas demasiado viejas o abandonadas.
4. **Poda de formación.** Los arándanos se pueden plantar formados en mata, separados 1,50 m, o formarse a partir de esqueje.
5. **Cuándo podar.** Los arándanos se podan a finales de febrero, justo antes del inicio del periodo vegetativo.
6. **Poda de fructificación.** La fructificación aparece en la madera del año anterior, y cuanto más vigorosas son las ramas, más grandes y numerosas son las bayas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Los arándanos se podan a finales de febrero, justo antes del inicio del periodo vegetativo.

Herramientas y materiales

- ☐ Sustrato
- ☐ Maceta

Errores típicos

- No se corta el extremo de las ramas conservadas, donde se encuentran las yemas de flor.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/8/clase/1>

© Academia de Jardinería