

Grosellero negro: ficha, formación, palmeta en abanico y fructificación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 2

En 3 ideas

1. El grosellero negro (*Ribes nigrum*) es un arbusto vigoroso que forma matas de 1 a 1,50 m de altura.
2. Tiene raíces superficiales y le perjudican tanto el calor seco como la humedad estancada.
3. Es la forma que más se vende en los viveros.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Sus hojas caducas son muy aromáticas al frotarlas.
2. **Clima y suelo.** En España se da mejor en el norte y en zonas frescas de montaña; en zonas cálidas necesita sombra parcial y riego.
3. **Formación en mata.** A partir de una planta de dos o tres años.
4. **Palmeta en abanico.** Las matas jóvenes se plantan en hilera a 1-1,20 m.
5. **Poda de fructificación.** La fruta aparece en los pequeños brotes laterales de la madera de dos años; cuando las ramas llegan a tres o cuatro años, la producción baja.
6. **Poda de restauración.** Las matas olvidadas echan brotes débiles por la edad y el exceso de ramaje.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda de fructificación se hace en febrero.

Herramientas y materiales

- ☐ Sierra
- ☐ Rafia
- ☐ Pasta cicatrizante

Errores típicos

- No se despunta el extremo de los tallos principales, porque se reduciría la cosecha siguiente.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/2>

© Academia de Jardinería