

Grosellero rojo I: ficha y formación en mata

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 3

En 3 ideas

1. El grosellero rojo (*Ribes rubrum*) es un arbusto muy rústico de alrededor de 1,50 m de altura, de hoja caduca.
2. Es poco exigente con el terreno, pero prefiere un suelo con pH de 5,8 a 6,8, medianamente arcilloso y rico en humus.
3. La forma habitual es la mata arbustiva, con 15 a 20 ramas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Florece en abril y da racimos de bayas rojas, rosas o blancas, según la variedad, que se recogen de junio a agosto.
2. **Suelo y exposición.** Tiene raíces superficiales y teme la sequedad.
3. **Formas.** También se pueden atar las ramas de una mata sobre alambres en abanico o en Y (también llamada «en lira»), limitando el número de ramas a 8 o 10.
4. **Formación en mata a partir de una planta de tres años.** Se planta de noviembre a marzo.
5. **Formación en mata a partir de un esqueje.** Se planta el esqueje entre noviembre y febrero dejando solo dos yemas sobre el suelo.
6. **La lógica de la formación.** Los cortes cortos provocan brotes desde la base y una mata densa en ramas; los cortes sobre yema exterior mantienen el centro abierto y ventilado, lo que facilita la cosecha y reduce los problemas de hongos.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda se hace en febrero. En España se cultiva bien en el norte y en zonas de montaña; en el interior y en el litoral mediterráneo necesita protección del sol de la tarde, un acolchado en el pie y riego regular en verano.

Herramientas y materiales

- ☐ Tijeras
- ☐ Esquejes
- ☐ Acolchado



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/3>

© Academia de Jardinería