

Tema 9: Grosellero y kiwi

Curso de poda de árboles frutales

Índice

	Clase	Pág.
Clase 1	Grosellero espinoso: ficha, formación, fructificación y restauración	2
Clase 2	Grosellero negro: ficha, formación, palmeta en abanico y fructificación	3
Clase 3	Grosellero rojo I: ficha y formación en mata	4
Clase 4	Grosellero rojo II: sobre tallo, palmeta y fructificación	5
Clase 5	Kiwi: ficha y poda de formación en palmeta irregular	6
Clase 6	Kiwi: palmeta de ramas horizontales, cenador y pérgola	7
Clase 7	Kiwi: fructificación y restauración	8



cursosdejardineria.com

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9>

© Academia de Jardinería

Grosellero espinoso: ficha, formación, fructificación y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 1

En 3 ideas

1. El grosellero espinoso (*Ribes uva-crispa*) es un arbusto de matorral muy frondoso, de 1 a 1,20 m de altura como máximo, de hoja caduca, con ramas muy espinosas y flexibles que tienden a tumbarse.
2. Es una planta de clima fresco.
3. Se puede comprar formado en vivero o formarlo a partir de esqueje.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Florece en marzo y abril, y sus bayas redondas, verdes, amarillas, blancas o rojas según la variedad, se recogen en julio y agosto.
2. **Clima y suelo.** En zonas frías se planta a pleno sol; en zonas cálidas teme la sequedad y necesita una exposición sombreada.
3. **Formas.** Lo habitual es la mata arbustiva, con 15 a 20 ramas.
4. **Poda de formación en mata.** A partir de una planta de dos o tres años.
5. **Poda de fructificación.** Se suprimen las ramas de cinco o seis años, que producen cada vez menos, los tallos sobrantes o enredados, la madera muerta y las ramas demasiado bajas.
6. **Poda de restauración.** Las matas abandonadas durante años se rejuvenecen antes de que arranque la vegetación.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda se hace en febrero.

Herramientas y materiales

- ☐ Tijeras
- ☐ Guantes



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/1>

© Academia de Jardinería

Grosellero negro: ficha, formación, palmeta en abanico y fructificación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 2

En 3 ideas

1. El grosellero negro (*Ribes nigrum*) es un arbusto vigoroso que forma matas de 1 a 1,50 m de altura.
2. Tiene raíces superficiales y le perjudican tanto el calor seco como la humedad estancada.
3. Es la forma que más se vende en los viveros.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Sus hojas caducas son muy aromáticas al frotarlas.
2. **Clima y suelo.** En España se da mejor en el norte y en zonas frescas de montaña; en zonas cálidas necesita sombra parcial y riego.
3. **Formación en mata.** A partir de una planta de dos o tres años.
4. **Palmeta en abanico.** Las matas jóvenes se plantan en hilera a 1-1,20 m.
5. **Poda de fructificación.** La fruta aparece en los pequeños brotes laterales de la madera de dos años; cuando las ramas llegan a tres o cuatro años, la producción baja.
6. **Poda de restauración.** Las matas olvidadas echan brotes débiles por la edad y el exceso de ramaje.

Cuándo hacerlo

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda de fructificación se hace en febrero.

Herramientas y materiales

- ☐ Sierra
- ☐ Rafia
- ☐ Pasta cicatrizante

Errores típicos

- No se despunta el extremo de los tallos principales, porque se reduciría la cosecha siguiente.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/2>

© Academia de Jardinería

Grosellero rojo I: ficha y formación en mata

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 3

En 3 ideas

1. El grosellero rojo (*Ribes rubrum*) es un arbusto muy rústico de alrededor de 1,50 m de altura, de hoja caduca.
2. Es poco exigente con el terreno, pero prefiere un suelo con pH de 5,8 a 6,8, medianamente arcilloso y rico en humus.
3. La forma habitual es la mata arbustiva, con 15 a 20 ramas.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo es.** Florece en abril y da racimos de bayas rojas, rosas o blancas, según la variedad, que se recogen de junio a agosto.
2. **Suelo y exposición.** Tiene raíces superficiales y teme la sequedad.
3. **Formas.** También se pueden atar las ramas de una mata sobre alambres en abanico o en Y (también llamada «en lira»), limitando el número de ramas a 8 o 10.
4. **Formación en mata a partir de una planta de tres años.** Se planta de noviembre a marzo.
5. **Formación en mata a partir de un esqueje.** Se planta el esqueje entre noviembre y febrero dejando solo dos yemas sobre el suelo.
6. **La lógica de la formación.** Los cortes cortos provocan brotes desde la base y una mata densa en ramas; los cortes sobre yema exterior mantienen el centro abierto y ventilado, lo que facilita la cosecha y reduce los problemas de hongos.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La poda se hace en febrero. En España se cultiva bien en el norte y en zonas de montaña; en el interior y en el litoral mediterráneo necesita protección del sol de la tarde, un acolchado en el pie y riego regular en verano.

Herramientas y materiales

- ☐ Tijeras
- ☐ Esquejes
- ☐ Acolchado



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/3>

© Academia de Jardinería

Grosellero rojo II: sobre tallo, palmeta y fructificación

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 4

En 3 ideas

1. Se parte de un esqueje de *Ribes rubrum* de 50 a 60 cm.
2. Se usa como portainjerto *Ribes aureum*.
3. Las matas jóvenes se plantan en hilera a 1-1,20 m.

Puntos clave de la clase

1. **Grosellero sobre tallo a partir de un esqueje largo.** Se planta entre noviembre y febrero enterrándolo hasta tres yemas, y se eliminan de cuatro a seis yemas de la base del esqueje.
2. **Grosellero sobre tallo por injerto.** Se planta el esqueje entre noviembre y febrero con dos yemas sobre el suelo y se guía con un tutor la rama de la yema del extremo; la rama inferior se pinza a tres o cuatro hojas.
3. **Palmeta en abanico.** El primer año se eligen de tres a cinco ramas sin bifurcar y muy vigorosas y se atan en abanico.
4. **Poda de fructificación.** La fruta aparece a partir del tercer año en los tallos y a partir del segundo en las ramificaciones.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Se planta entre noviembre y febrero enterrándolo hasta tres yemas, y se eliminan de cuatro a seis yemas de la base del esqueje. Se planta el esqueje entre noviembre y febrero con dos yemas sobre el suelo y se guía con un tutor la rama de la yema del extremo; la rama inferior se pinza a tres o cuatro hojas.

Herramientas y materiales

- ☐ Sierra
- ☐ Tutor
- ☐ Rafia
- ☐ Pasta cicatrizante



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/4>

© Academia de Jardinería

Kiwi: ficha y poda de formación en palmeta irregular

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 5

En 3 ideas

1. El kiwi (*Actinidia deliciosa*) es un arbusto trepador de tallos sarmentosos y hoja caduca.
2. El kiwi es dioico: las flores masculinas y las femeninas están en plantas distintas.
3. Prefiere semisombra, con exposición este u oeste.

Puntos clave de la clase

1. **Dos plantas parecidas.** Sus tallos vigorosos pueden crecer hasta 8 m en un año.
2. **Plantas macho y hembra.** Solo dan fruto las plantas hembra, que necesitan un macho cerca para la polinización.
3. **Clima y suelo.** Es muy rústico en invierno, pero los brotes jóvenes se hielan hacia los -4°C , por lo que las heladas tardías de primavera son su principal riesgo.
4. **Objetivos de la poda.** La poda de formación crea el esqueleto de la planta, con una o varias ramas principales, y provoca el nacimiento de ramas fructíferas.
5. **Formación en palmeta irregular.** Las ramas se reparten sin un orden fijo sobre un cenador o un muro para cubrir toda la superficie.
6. **Sanidad.** La bacteriosis del kiwi es una enfermedad bacteriana que entra por las heridas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La recolección va de mediados de agosto a mediados de octubre según la variedad y la zona; en España el kiwi grande suele cosecharse en otoño. La poda de fructificación se hace a finales del invierno.

Herramientas y materiales

- ☐ Semillas
- ☐ Maceta



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/5>

© Academia de Jardinería

© Academia de Jardinería

Kiwi: fructificación y restauración

Curso de poda de árboles frutales · Tema 9: Grosellero y kiwi · Clase 7

En 3 ideas

1. La fructificación del kiwi se parece mucho a la de la vid.
2. La poda de invierno se hace hacia febrero, con la planta en reposo.
3. Las ramas fructíferas se cortan a dos yemas por encima del último fruto.

Puntos clave de la clase

1. **Cómo fructifica.** Es una liana sarmentosa: la rama principal hace de cepa, se divide en ramas secundarias y estas llevan las ramas fructíferas.
2. **Calendario.** Los desbrotados y pinzamientos se hacen en abril y mayo.
3. **Poda de invierno.** Para localizar ese punto se dejan en las ramas los pedúnculos de los frutos al recolectar.
4. **Poda de verano.** En julio se pinzan las ramas fructíferas de las plantas hembra por encima de la cuarta hoja después del último grupo de flores o de frutos.
5. **Rejuvenecer las ramas fructíferas.** Para mantener una producción regular, las ramas fructíferas se rejuvenecen cada tres o cuatro años, renovando aproximadamente un tercio cada año.
6. **Rejuvenecer las ramas principales.** Cuando una o varias ramas principales muestran debilidad o agotamiento, se elige en verano un brote bien situado y se ata a lo largo de la rama existente.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. En esta clase vemos cómo fructifica el kiwi, cuándo y cómo se hace la poda de invierno y la de verano en plantas hembra y macho, cómo se rejuvenecen las ramas fructíferas y las principales, y cómo se restaura un kiwi abandonado. Conviene no retrasar la poda de invierno hasta el inicio de la brotación.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/frutales/tema/9/clase/7>

© Academia de Jardinería