

Tipos de desarrollo postembrionario

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 3: Desarrollo y comportamiento de los insectos · Clase 4

En 3 ideas

1. Abarca desde que el insecto sale del huevo como inmaduro, una vez concluido el desarrollo embrionario, hasta que alcanza el estado de adulto.
2. Ni el tamaño ni, a menudo, el aspecto del recién emergido se parecen a los del adulto.
3. Para llegar al tamaño y a la forma definitivos del insecto perfecto tiene que recorrer un desarrollo largo, con fases distintas y, en muchos casos, con transformaciones profundas.

Puntos clave de la clase

1. En un sentido amplio, metamorfosis es ese conjunto de cambios del inmaduro hasta el adulto, aunque el paso final conlleve cambios morfológicos y estructurales muy fuertes.
2. Pulgón y cochinilla no crecen como mariquita y procesionaria.
3. Si los mezclas, vas a buscar un capullo donde no lo hay, o a tratar de larva lo que ya es casi adulto.
4. La metamorfosis incompleta o simple: el insecto no experimenta grandes cambios de forma a lo largo de su vida, de modo que las larvas son bastante semejantes a los adultos o difieren muy poco.
5. Durante el ciclo se producen mudas sucesivas, hasta que en la última aparece un adulto completo.
6. En el rosal, el pulgón joven ya se parece al pulgón hecho: más pequeño, a veces sin alas, pero reconocible como el mismo bicho.

Errores típicos

- No los pises pensando que ya no hay insecto: hay uno rehaciéndose, sin comer.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/3/clase/4>

© Academia de Jardinería