

Antracnosis del castaño

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 8: Enfermedades del jardín · Hongos foliares · Clase 7

En 3 ideas

1. Dejamos el plátano y pasamos a otra antracnosis, la del castaño.
2. Sus huéspedes son las frondosas en general, es decir, los árboles de hoja ancha, y especialmente el roble y el castaño.
3. En este último es el responsable de la enfermedad que se conoce como antracnosis del castaño.

Puntos clave de la clase

1. En primavera y verano, sobre las hojas, tanto por el haz como por el envés, aparecen unas manchas de color pardo con el borde amarillo.
2. Esas manchas se van extendiendo y se juntan por todo el limbo, que es la parte ancha de la hoja, dándole un aspecto de mosaico muy característico.
3. Fíjate en los dos rasgos que te ayudan a reconocerla: el color pardo de la mancha y el borde amarillo que la rodea.
4. En ataques fuertes, como los que se dan en años con veranos lluviosos y temperaturas suaves, puede producirse la caída de hojas y, en su caso, de frutos.
5. Es decir, que el tiempo manda: si el verano es lluvioso y templado, el hongo tiene sus mejores condiciones, y si no, suele pasar desapercibido.
6. La primera es de tipo cultural, es decir, de trabajo en el jardín: quemar las hojas caídas al suelo.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Es decir, que el tiempo manda: si el verano es lluvioso y templado, el hongo tiene sus mejores condiciones, y si no, suele pasar desapercibido. Si un año ves que el verano ha sido así, conviene que revises las hojas del castaño con más atención de lo habitual, porque es entonces cuando el hongo puede pasar de una molestia pequeña a una caída de hojas y de frutos.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/8/clase/7>

© Academia de Jardinería