

Especies habituales de hongos xilófagos

Curso de plagas y enfermedades de las plantas · Tema 9: Enfermedades del jardín · Hongos de la madera · Clase 5

En 3 ideas

1. De ahí salen dos consecuencias prácticas.
2. La primera es que, si el duramen queda expuesto al exterior, casi siempre acaba entrando algún hongo, y por la misma razón los ejemplares viejos son especialmente vulnerables.
3. La segunda es que, cuando estos parásitos sí consiguen colonizar los tejidos vasculares vivos, como hacen Armillaria y Rosellinia, entre otros, siempre acaban matando a su hospedador, de forma directa y más o menos rápida.

Puntos clave de la clase

1. Después muestra el fieltro blanco que forma Armillaria bajo la corteza de un pino, el micelio blanco en una platanera muerta por este hongo y las setas de Armillaria mellea.
2. Lo que aquí importa es reconocer los nombres y saber cómo se diagnostican.
3. Los carpóforos, o sea las setas, aparecen con tiempo húmedo y temperaturas suaves, y se quedan en el árbol un tiempo más o menos largo según el agente.
4. Son un signo inequívoco de la presencia de estos hongos, y además sirven para identificarlos, aunque no eliminan la necesidad de un análisis de laboratorio.
5. Muchas veces, cuando aparecen las setas el micelio ya ha prosperado mucho dentro de la madera.
6. Otro signo de actividad son las cavidades que forma la madera degradada.

Herramientas y materiales

- ☐ Nivel
- ☐ Acolchado

Errores típicos

- En las podas, hay que evitar las indiscriminadas o abusivas y hacerlas siempre con personal cualificado y formado.



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/plagas/tema/9/clase/5>

© Academia de Jardinería