

Poda grupo 2

Curso de poda de arbustos · Tema 4: Tipos de poda 1 · Clase 14

En 3 ideas

1. El grupo 2 se parece al anterior en el calendario, pero cambia el escenario de la flor.
2. Pensad en *Spiraea japonica* o en el taray *Tamarix parviflora*: son caducifolios que florecen de forma axilar o en pequeñas ramificaciones laterales sobre brotes formados en la misma estación vegetativa.
3. La flor no corona solo el extremo; se reparte a lo largo de la madera joven.

Puntos clave de la clase

1. Esas yemas darán origen a un buen número de laterales, y ahí aparecerá la floración.
2. Si cortáis tan corto como en una budleia de grupo 1, os quedáis sin escenario para esa flor axilar.
3. En reposo vegetativo se reducen ligeramente las ramas más largas.
4. Justo después de la floración se eliminan ramas viejas dejando jóvenes bien situadas que reconstituyan el arbusto y la flor del año siguiente.
5. Es un diálogo entre contención suave en invierno y limpieza renovadora cuando la flor ya ha cumplido.
6. En un arriate de espireas japonesas de urbanización, el error clásico es tijeretear todo el volumen a bola en marzo como si fuera un seto formal.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. La próxima clase entra en el grupo 3, donde la floración es temprana sobre madera del año anterior: ahí el momento del corte cambia por completo, y podar en reposo os puede costar la flor de la primavera. La *Spiraea japonica* de un macizo municipal suele sobrevivir a podas torpes porque es generosa, pero la floración se resentirá si cada invierno la dejáis en muñones mínimos.

Errores típicos

- No hace falta geometría de seto; hace falta luz al centro y renovación.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/4/clase/14>

© Academia de Jardinería