

Poda grupo 3

Curso de poda de arbustos · Tema 4: Tipos de poda 1 · Clase 15

En 3 ideas

1. El grupo 3 —lilas como *Syringa vulgaris*, retamas como *Cytisus scoparius*— son caducifolios de floración muy temprana, a principios de primavera o incluso antes de que termine el invierno.
2. Florecen en el ápice de brotes formados o preformados en la estación anterior: madera de un año.
3. La yema terminal que pasó el invierno es, en muchos casos, la futura flor.

Puntos clave de la clase

1. Cualquier intervención fuerte en reposo vegetativo sacrifica flor: el corte se lleva las yemas terminales que iban a abrirse al final del reposo.
2. Es el error clásico del lilo podado en febrero “porque tocaba” y luego sin perfume en abril.
3. Así quitáis lo florecido y provocáis el crecimiento vigoroso de ramas de reemplazo que, durante el resto de la estación, se coronarán en otoño con yema de flor para la primavera siguiente.
4. En invierno, en reposo, no hagáis más poda que limpieza y formación ligera: no toquéis esas apicales floríferas.
5. En un jardín de pueblo con un lilo junto al muro, la escena ideal es esta: mayo, flor casi pasada, tijera limpia, cortes a dos o tres yemas, centro aireado, y el resto del año paz.
6. La retama, más sensible a cortes mal situados, pide la misma delicadeza de momento: después de flor, no en el frío profundo si eso os lleva las yemas.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Es el error clásico del lilo podado en febrero “porque tocaba” y luego sin perfume en abril. En invierno, en reposo, no hagáis más poda que limpieza y formación ligera: no toquéis esas apicales floríferas.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/4/clase/15>

© Academia de Jardinería