

Poda grupo 4

Curso de poda de arbustos · Tema 4: Tipos de poda 1 · Clase 16

En 3 ideas

1. El grupo 4 incluye, por ejemplo, el celindo *Philadelphus coronarius* y la forsitia *Forsythia* × *intermedia*.
2. Como el grupo 3, son de floración temprana de primavera —la forsitia, especialmente temprana—, pero la flor aparece en yemas axilares o en pequeñas ramificaciones laterales sobre brotes formados el año anterior.
3. No es solo el tip: es un rosario de flor sobre la madera de un año.

Puntos clave de la clase

1. La poda de floración se hace de manera similar a la del grupo 3: después de la floración, pero eliminando en torno a un tercio de la longitud.
2. No es el corte a dos yemas tan corto del lilo; es un acortamiento más generoso en longitud, renovando sin pelar la planta.
3. En invierno podéis hacer limpieza y formación, y un ligero acortamiento de las ramas más largas para favorecer brotación lateral florífera.
4. Lo que no cabe es una poda intensa de reposo: os cargaríais la flor de la primavera.
5. En un seto libre de forsitia delante de una casa, el espectáculo de marzo se arruina si en enero alguien “limpia a fondo” con cortasetos.
6. Mejor: disfrutar la flor, luego aclarar y acortar un tercio, y en invierno solo lo justo.

Cuándo hacerlo



En verde, los meses o estaciones que cita la clase. Lo que no cabe es una poda intensa de reposo: os cargaríais la flor de la primavera. Mejor: disfrutar la flor, luego aclarar y acortar un tercio, y en invierno solo lo justo.

**cursosdejardineria.com**

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/4/clase/16>

© Academia de Jardinería