

Poda de renovación de setos

Curso de poda de arbustos · Tema 5: Tipos de poda 2 · Clase 9

En 3 ideas

1. El continuo recorte, la eliminación progresiva de yemas, la limitación de crecimiento y la falta de luz en el interior aceleran el envejecimiento.
2. Se elimina la vegetación externa y no se dejan yemas laterales normales; quedan al descubierto las ramas principales.
3. En setos de coníferas (ciprés, arizonica, tuyas, tejo, etc.) esta poda no es posible: no tienen carga suficiente de yemas latentes para rebrotar en madera vieja.

Puntos clave de la clase

1. **Por qué llega el momento de renovar.** Aparecen zonas muertas o desnudas en la superficie, o desequilibrios claros.
 2. **En qué consiste la renovación.** El rebrote solo es posible a partir de yemas latentes.
 3. **Coníferas: no renovar.** Ante el deterioro grave, la solución es la reposición con plantas nuevas, no forzar un rebaje drástico.
 4. **Frondosas: sí, con matices.** Las frondosas formadoras de seto, de hoja caduca o perenne (por ejemplo el mirto), sí pueden responder a una poda de renovación.
-



cursosdejardineria.com

Escanea el código para ver esta clase completa y escuchar su podcast.

<https://cursosdejardineria.com/curso/poda/tema/5/clase/9>

© Academia de Jardinería